

## BRODDELEN

De kernverschijnselen van broddelen hebben zoals bij stotteren te maken met vloeiend spreken. Kenmerkend is:

- Te snel spreken met veel herhalingen;
- Algemene uitdrukkingmoeilijkheden;
- Slordig articuleren.


Daarnaast kunnen ook moeilijkheden optreden bij het lezen en schrijven, taalmoeilijkheden, persoonlijkheidsstoornissen en motorische problemen.

In de broddeltherapie leert men broddelen herkennen en worden problemen zoveel mogelijk weggewerkt.

## CONTACT

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met de dienst logopedie:

T +32 (0)50 63 39 45 (campus Knokke-Heist)  
T +32 (0)50 43 49 45 (campus Blankenberge)



ons hart voor uw zorg

AZ OLV Ter Linden  
Graaf Jansdijk 162  
8300 Knokke-Heist  
T +32 (0)50 63 31 11  
F +32 (0)50 63 35 19  
[www.vzwgo.be](http://www.vzwgo.be)

AZ Koningin Fabiola  
Dr. F. Verhaeghestraat 1  
8370 Blankenberge  
T +32 (0)50 43 41 11  
F +32 (0)50 43 45 19  
[www.vzwgo.be](http://www.vzwgo.be)



Logopedie omvat preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.



### AFASIE

Na een hersenletsel (CVA, hersenbloeding, tumor, trauma,...) kunnen mensen te kampen krijgen met afasie. Meestal is dit gelokaliseerd in de linker hemisfeer. Afasie is een verworven taalstoornis, waardoor mensen niet meer of gedeeltelijk kunnen begrijpen en niet meer of moeilijk kunnen spreken, lezen en schrijven. Het is een stoornis die plotseling optreedt. Door taaltherapie kan de patiënt de resterende begrips- en taal mogelijkheden uitbreiden en leren om zich zo goed mogelijk uit te drukken om menselijke contacten te onderhouden. Zo gaan we bijvoorbeeld in op de woordvindingsmoeilijkheden of optimaliseren we het begripsvermogen en/of de zinsbouw.

### DYSARTRIE

Eveneens na een hersenletsel kan dysartrie ontstaan. Dysartrie verwijst naar een spraakstoornis die veroorzaakt wordt door zenuwletsels die een zwakte, een incoördinatie of verlamming van de spraakspieren kunnen veroorzaken. De aantasting van de spraak kan betrekking hebben op de ademhaling, de stem, de articulatie, de resonantie en de intonatie. Vaak is er ook een aangezichtsverlamming aanwezig.

De logopediste geeft oefeningen voor de aangezichtsmotoriek en leert de juiste spraak aan.



### SLIKSTOORNISSEN

Voeding is één van de belangrijkste elementen die ons lichaam nodig heeft. Slikken is een automatisch proces dat echter kan verstoord worden ten

gevolge van een neurologische aandoening of algemene verzwakking.

Met slikrevalidatie kan de patiënt het slikmechanisme opnieuw leren controleren met de aangepaste consistentie. De eet- en drinkfuncties kunnen hierdoor verbeterd worden.

### STEM

Onze stem laat het soms afweten door de aanwezigheid van stembandknobbels, een stembandparalyse, verkeerd stemgebruik, ... of na een laryngectomie (= chirurgisch verwijderen van het strottenhoofd ten gevolge van kanker). Met logopedische therapie kan u leren uw stem juist te gebruiken. Hierbij wordt de juiste ademhaling en de juiste stemgeving aangeleerd (mede door ontspanning). Bij een laryngectomie opteren we voor een alternatief spraakgebruik, namelijk de slokdarmspraak of spreken door het gebruik van mechanische hulpmiddelen.

### STOTTEREN

Stotteren is een stoornis in het vloeiend spreken door (snelle) herhalingen van lettergrepen en/of klanken, verlengingen van klanken en/of blokkeringen. Hierbij kunnen er ook emotionele reacties en negatieve ideeën optreden in verband met spreken.

In de stottertherapie leert u zo vloeiend mogelijk te spreken door op een positieve manier om te gaan met negatieve gevoelens en gedachten.